

## Желтая лихорадка

**Ситуация.** По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 32 странах Африки и 12 странах Южной Америки желтой лихорадкой ежегодно заболевают около 200 тысяч человек. Более 80 % всех больных приходится на страны Африки. Летальность при этой инфекции в странах Африки колеблется от 21 % в Либерии до 37 % в Гвинее; в странах Южной Америки – от 47 % в Колумбии до 52 % в Бразилии. За период с 2001 по 2005 годы были зарегистрированы 3 завозных случая заболевания, 2 из которых закончились смертельным исходом у граждан Европы (Нидерланды, Бельгия) и США, которые посещали эндемичные страны без предварительной вакцинации против желтой лихорадки.

С начала XXI века отмечается активизация природных очагов желтой лихорадки, о чем свидетельствует регистрация случаев заболеваний в Гвинее и Бразилии (2000 год), Гамбии (2001 год), Мали (2004 год), где желтая лихорадка не регистрировалась в течение предшествующих 10-50 лет. После более 20-летнего отсутствия заболеваний в 2007 году в Того вновь были зарегистрированы 5 больных желтой лихорадкой. По мнению экспертов ВОЗ истинная заболеваемость значительно превышает регистрируемую.

***Страны, требующие наличия международного свидетельства о вакцинации:***

Бенин,	Либерия,
Буркина-Фасо,	Мали,
Габон,	Нигер,
Гана,	Руанда,
Демократическая республика Конго,	Сан-Томе и Принсипи,
Конго,	Того,
Кот-д'Ивуар,	Центральноафриканская Республика,
Камерун,	Гвиана Французская.

***Страны, при въезде в которые рекомендованы прививки против желтой лихорадки,*** поскольку в них имеются зараженные желтой лихорадкой районы, и существует риск заражения данной инфекцией:

Ангола,	Танзания,
Бурунди,	Чад,
Гамбия,	Экваториальная Гвинея,
Гвинея,	Боливия,
Гвинея-Биссау,	Бразилия,
Кения,	Венесуэла,
Мавритания,	Гайана,
Нигерия,	Колумбия,
Сенегал,	Панама,
Сьерра-Леоне,	Перу,
Сомали,	Суринам,
Судан,	Тринидад и Тобаго,
Уганда,	Эквадор.

**Меры профилактики.** Вакцинация против желтой лихорадки остается самым эффективным средством предотвращения заболевания. Вакцина вызывает выработку иммунитета продолжительностью 10 лет. Поскольку антитела появляются через 7-10 дней после вакцинации, срок проведения вакцинации - не менее, чем за 10 дней до выезда.

**О прививочном кабинете в Республике Башкортостан.** В Республике Башкортостан разрешение на проведение вакцинации против желтой лихорадки имеет прививочный кабинет Медико-санитарной части ОАО «Международный аэропорт «Уфа», расположенный по адресу 450501, Уфимский район, с. Булгаково, микрорайон Аэропорт. Время работы с 8.30 до 13.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Номера телефонов для получения дополнительной информации: 2295 505, 2295 644, 2295 614.

Иммунизация проводится на платной основе лицам, не имеющим противопоказаний. При этом данные о проведении вакцинации (ревакцинации) заносятся в международное свидетельство о вакцинации, которое заполняется на английском или французском языках и в дополнении на русском языке. Свидетельство считается действительным в течение 10 лет, начиная с 10-го дня после вакцинации.

**Меры неспецифической профилактики.** При пребывании в эндемичных по желтой лихорадке зонах необходимо использовать вещества, защищающие от укусов комаров - репелленты.