

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ (ХРОНИЧЕСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ И АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ) в 2003-2007 годах

По данным формы № 11 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в 2007 году в республике число зарегистрированных наркологических расстройств составило 65308 (1,6% населения республики), из них 11671 – у женщин (17,9%). Контингент наркологических больных, состоящих под диспансерным наблюдением в республике (далее – контингент), составил 1465,8 на 100 тыс. населения (рис. 1).




Рис. 1. Динамика наркологических расстройств среди населения Республики Башкортостан в 2003-2007 годах, на 100 тыс. населения

Среднемноголетний показатель заболеваемости наркологическими расстройствами в 2003-2007 годах в республике составил 143,4 на 100 тысяч населения. На 27 административных территориях среднемноголетний показатель заболеваемости в 2003-2007 годах выше республиканского, причем более чем в 1,5-1,9 раза – в городах Бирск, Белебей, Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Стерлитамак, Туймазы и прилежащих районах, Куюргазинском, Мечетлинском, Миякинском и Стерлитамакском районах (рис.2). Высокие темпы прироста заболеваемости за год зарегистрированы в г.Дюртюли и прилежащем районе (в 2,3 раза) и Кармаскалинском районе (в 2,1 раза).




Рис. 2. Впервые выявленная заболеваемость наркологическими расстройствами среди населения Республики Башкортостан (по среднемуголетному показателю в 2003-2007 годах), на 100 тыс. населения

Хронический алкоголизм. Заболеваемость хроническим алкоголизмом больше характерна для городского населения республики – 60,5% в общем числе больных. В 2007 году показатель заболеваемости хроническим алкоголизмом составил 96,0 на 100 тыс. населения, среди женщин – 43,1. Диагноз «хронический

алкоголизм» в 2007 году поставлен 48 подросткам, из них 18 – девушки, за год заболеваемость подростков хроническим алкоголизмом увеличилась на 9,8%.

В 2007 году показатель заболеваемости алкогольными психозами и хроническим алкоголизмом в республике составил 122,8 на 100 тысяч населения (рис. 3). На 30 административных территориях республики этот показатель в 2007 году выше республиканского, причем более чем в 1,5 раза – в городах Октябрьский, Стерлитамак, Кумертау, Белорецк, Ишимбай, Туймазы и прилегающих районах, Архангельском, Бижбулякском, Мечетлинском и Куюргазинском и Стерлитамакском районах (рис. 4).




Рис. 3. Динамика заболеваемости населения Республики Башкортостан алкогольными психозами и хроническим алкоголизмом в 2003-2007 годах, на 100 тыс. населения

Среднегодовой показатель заболеваемости алкогольными психозами и хроническим алкоголизмом в 2003-2007 годах в республике составил 132,0 на 100 тысяч населения. На 30 административных территориях среднегодовой показатель заболеваемости в 2003-2007 годах выше республиканского, причем более чем в 1,5 раза – в городах Стерлитамак, Белебей, Белорецк, Ишимбай, Мелеуз, Кумертау и прилегающих районах, Мечетлинском и Миякинском районах.

Алкогольные психозы. Около 80% всех алкогольных психозов регистрируется в городах республики. Относительная заболеваемость алкогольными психозами населения республики за год снизилась на 8,8% и составила 26,8 на 100 тыс. населения (РФ в 2005 году – 53,9). На долю женского населения приходится 18,7% алкогольных психозов.

Среднегодовой показатель заболеваемости алкогольными психозами в 2003-2007 годах в республике составил 49,9 на 100 тыс. населения. Среднегодовой показатель заболеваемости в 2003-2007 годах выше республиканского в Бакалинском, Белокатайском и Чишминском районах.

Ростом заболеваемости алкогольными психозами характеризуются 19 территорий республики, из них высокий прирост в сравнении с 2006 годом от-

мечен в Кугарчинском районе в 6 раз), в городе Дюртюли и прилежащем районе (в 4,8 раза), Абзелиловском и Шаранском районах (в 3 раза).




Рис. 4. Заболеваемость и контингент больных алкогольными психозами и хроническим алкоголизмом в 2007 году, на 100 тыс. населения

Наркомании. В Республике Башкортостан последнее десятилетие характеризовалось ростом числа больных наркоманией и лиц, злоупотребляющих наркотиками. Заболеваемость наркоманиями за год увеличилась на 26,8% и составила в 2007 году 12,3 на 100 тысяч населения (РФ в 2005 году – 14,7), причем 67,4% – это городское население (рис. 5). За год заболеваемость женского населения выросла в 2 раза, а среди подростков – в 2,3 раза. В 2007 году впервые за 5 лет на диспансерный учет поставлен 1 ребенок. Высокие уровни заболеваемости зарегистрированы на 12 территориях: из них в городе Октябрьский, городах Бирск, Ишимбай, Туймазы и прилежащих районах – в 2-3,4 раза, Нефтекамск – в 1,8 раза, Уфа и Уфимском районе в 1,7 раза выше, чем по республике (рис. 5).




Рис. 5. Динамика заболеваемости населения Республики Башкортостан наркоманиями в 2003-2007 годах, на 100 тыс. населения

Контингент больных наркоманиями в 2007 году составил 125,7 на 100 тыс. населения (РФ в 2005 г. – 227,7). На 13 территориях республики наблюдается рост заболеваемости наркоманиями, из них в Уфимском районе – в 11,9 раз, в Чишминском районе – в 7,9 раз, в городе Салават – в 2,6 раза (рис. 6).

Среднемноголетний показатель заболеваемости наркоманиями в 2003-2007 годах в республике составил 10,5 на 100 тысяч населения, на 8 административных территориях – выше республиканского, более чем в 1,8-2,7 раза – в городах Октябрьский и Уфа, городах Белорецк, Бирск, Ишимбай, Туймазы и прилежащих районах.




Рис. 6. Заболеваемость и контингент больных наркоманиями в 2007 году, на 100 тыс. населения **Токсикомании.** Контингент лиц с синдромом зависимости от ненаркотических (токсических) веществ в 2007 году в республике составил 8,0 на 100 тыс. населения и вырос в сравнении с 2003 годом в 1,5 раза (рис. 8).




Рис. 7. Динамика заболеваемости населения Республики Башкортостан токсикоманиями в 2003-2007 годах, на 100 тыс. населения

В 2007 году заболеваемость токсикоманиями в республике составила 0,7 на 100 тыс. населения (РФ в 2005 г. – 1,5). Значительный рост заболеваемости (более чем в 2 раза) отмечен в городе Ишимбай и прилегающем районе, Чишминском районе и городе Уфа. Заболеваемость детей в сравнении с 2006 годом увеличилась на 26,7%.

На 16 административных территориях среднегодовалый показатель заболеваемости за 2003-2007 годы выше республиканского (0,9 на 100 тысяч населения) в 1,5-6,2 раза – в городах Агидель, Сибай, Стерлитамак, городах Благовещенск, Ишимбай, Кумертау и прилегающих районах, Бижбулякском, Благоварском, Бураевском, Кармаскалинском, Туймазинском, Уфимском, Чишминском районах.

Анализ заболеваемости населения Республики Башкортостан психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, показал, что хотя наблюдаются стабилизация показателей и снижение темпов прироста в целом по республике, остаются актуальными следующие проблемы:

- рост потребления алкогольных напитков;
- рост алкоголизации женщин и подростков;
- высокие уровни наркологических расстройств на отдельных административных территориях;
- рост распространенности и заболеваемости наркоманиями, особенно среди подростков и женского населения.